1914 — N° 18

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 23 AOÛT 1878

Natura maxime miranda
in minimis.

PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, Rue Serpente, 28

1914

Le Bulletin paraît deux fois par mois.

AVIS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Le 2e trimestre des *Annales* de 1914 a paru.

L'Abeille. — Le 4e fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Depuis le 1er octobre 1914 la Bibliothèque est ouverte pour renseignements. tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler, les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et soufflage de chenilles.

Mlle C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (Ve).

Envoi du tarif sur demande.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 25 novembre 1914.

Présidence de M. Ch. ALLUAUD.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — MM. le Dr JEANNEL, le Dr M. ROYER et le Dr P. ACHERAY, tous les trois en bonne santé, dans des ambulances du front, se rappellent au souvenir de leurs confrères.

Distinction honorifique. — Notre collègue M. J. DE MUIZON, sous-lieutenant de réserve au 79e régiment d'infanterie, âgé de 23 ans, actuellement en traitement dans un hôpital de Rennes et dont nous avons annoncé la blessure dans un *Bulletin* précédent, vient d'être nommé Chevalier de la Légion d'honneur, après une citation à l'ordre de l'armée, pour sa brillante conduite sur le champ de bataille.

Nécrologie. — Le Président a le très vif regret d'annoncer la mort de Léon CARPENTIER, membre de notre Société depuis 1893, décédé à Amiens (Somme) le 18 novembre 1914, à l'âge de 76 ans.

L. CARPENTIER, qui s'occupait surtout d'Hyménoptères et de Coléoptères, a laissé une œuvre capitale, la 2e édition du Catalogue des Coléoptères de la Somme (1908), qui est d'une perfection rare et peut être citée comme un modèle de ce genre de travaux.

Changement d'adresse. — M. Enrico RAGUSA, via Alessio Narbone, 10, 1° p., à Palerme (Sicile).

Communications.

Descriptions de plusieurs espèces d'Arachnides récemment découvertes en France

par E. SIMON.

Lophocarenum Susannae, n. sp. — ♂. Céphalothorax brunâtre pourvu d'un gros lobe céphalique, vu en dessus aussi long que large

et très largement tronqué en avant, laissant voir le bord frontal. Scutum abdominal noir, fortement et densément ponctué. Tibia de la patte-mâchoire armé de deux apophyses : une apophyse supère très longue, relevée mais fortement arquée en avant, robuste mais longuement atténuée, un peu déprimée en dessus et obtuse, et une apophyse externe plus courte, perpendiculaire, robuste, atténuée, terminée en petit crochet aigu, recourbé en avant. Tarse armé en dessus, à la base, d'une longue apophyse dressée, verticale, épaisse à la base, ensuite grêle et droite, mais un peu courbée en avant à la pointe. Long. 2 mm.

Rhône : St-Germain-au-Mont d'Or (Cte de Dalmas).

Cette espèce se distingue de toute les autres par l'apophyse dressée du tarse, à part cela elle ressemble un peu au *L. nemorale.*

Cnephalocotes nesiotes, n. sp. — ♂. Assez voisin des *C. silus* Cambr. (= *Cn. pusillus* E. S., non Menge) et *crassirostris* E. S., il en diffère par le tibia de la patte-mâchoire vu en dessus assez étroit et au moins aussi long que large, un peu avancé, non atténué et tronqué droit à l'extrémité avec l'angle externe finement bordé de noir; son apophyse externe cachée en dessus, vue de profil dirigée en bas assez étroite et obtuse, par son tarse déprimé et fovéolé sur la face postérieure verticale, enfin par ses yeux postérieurs en ligne plus récurvée. Long. 1 1/2 mm. — Corse!

Sans localité précise; un mâle mêlé à mes *C. silus* de Corse, provenant de Corbara ou de Calvi.

Wideria Dalmasi, n. sp. — ♂. Céphalothorax noir olivâtre, pourvu d'un lobe céphalique très reculé, cylindrique, très incliné et détaché du plan frontal en avant, et d'une pointe frontale plus longue que le lobe, grêle mais un peu dilatée en massue à l'extrémité, obliquement tronquée et bordée de chaque côté d'une série de forts crins dressés et recourbés. Apophyse supéro-interne du tibia, vue en dessus, simple, non divisée, large mais très comprimée et tranchante en dessus avec le bord externe pourvu de 1 ou de 2 très petits denticules, très acuminée en pointe aiguë un peu recourbée. Abdomen noirâtre. Pattes blanc jaunâtre. — Long. 2 mm.

Htes-Pyrénées : Gabas (Cte de Dalmas).

Wideria languida, n. sp. — ♂. Voisin de *W. cucullata* C. K., en diffère par le lobe céphalique vu en dessus, ovale plus court, atténué, conique, obtus en avant, ses yeux plus gros, leur intervalle non double de leur diamètre, son apophyse tibiale supéro-interne simple, non

divisée, très atténuée mais très légèrement dilatée à l'extrémité en petite palette un peu relevée, armée sur ses bords d'épines inégales divergentes dont l'apicale souvent bacilliforme et obtuse. Long. 1,5 à 1,8 mm.

Bouches-du Rhône : les Alpines. Vaucluse : mont Luberon (nov. 1913 !).

Sur divers *Chauliognathus* Hentz [Col. Malacodermidae]

par Maurice Pic.

Chauliognathus sodalis Wat. — Cette espèce est variable. La forme type a les élytres entièrement testacés, mais ces organes sont tantôt testacés avec une large macule apicale noire (var. **Chevrolati,** n. var.), tantôt testacés à macule apicale noire avec une deuxième macule noire plus ou moins étendue autour de l'écusson (var. **praescutellaris,** n. var.). La forme type et les deux variétés sont originaires du Mexique : Durango (coll. Pic).

Chauliognathus tripartitus Chevr., n. var. **Waterhousei,** Bourg. in litt. — *Elytris testaceis, ad basin late nigro notatis.* — Costa Rica (P. Biolley in coll. Pic).

Cette variété se distingue de *C. tripartitus* Chevr. et des variétés déjà décrites par la coloration élytrale en majeure partie testacée.

Chauliognathus limbatithorax Pic, var. **sublimbatus,** n. var. — *Thorace nigro, minute testaceo notato, elytris nigris, ad medium testaceo maculatis, lateraliter postice apiceque testaceo limbatis.* — Bolivie (coll. Pic).

Très distinct de la forme type par la coloration en majeure partie foncée du prothorax et les dessins testacés des élytres.

Chauliognathus signatus Gorh. — On doit inscrire comme variété du *C. signatus* Gorh. (1) la *C. nigrocinctus* Gorh. A la même espèce doit être rapporté comme nouvelle variété, sous le nom de **nigrobasalis,** n. var., un exemplaire mexicain de ma collection dont les

(1) Le nom de *signatus* Gorh. doit prévaloir sur celui de *nigrocinctus* Gorh. qui le suit (Biol. Centr. Am. III, 2, p. 72), pour obéir aux lois de la priorité.

élytres sont entièrement testacés sauf une étroite bande basale noire; cette dernière variété mime la var. *Waterhousei* Pic décrite plus haut.

Contributions à l'étude des Carabiques d'Afrique et de Madagascar [Col.].

I. Descriptions de deux espèces nouvelles

par Ch. Alluaud.

Smeringocera Gestroi, n. sp. — *Long.* 6,5 mm. *Caput brunneum passim aeneo-nitens, strigulosum, breviter et sparse flavo-pubescens; fronte planiuscula, subquadrata; vertice juxta oculos utrinque setis duabus nigris ornato; occipite setis duabus basalibus, epistomate utrinque in angulo antico seta unica ornatis. Pronotum brunneum passim aeneo-nitens, transverse dense et rugose striatum, sparsissime flavo-pubescens; lateribus obscurioribus, stria longitudinali singulatim signatis. Elytra sulphurea brunneo-fasciata; fascia humerali obliqua dilutiore, fascia discoidali obscura; 9-striata, striis sat profundis, postice brunneo tinctis; intervallis planiusculis, in medio intervallorum 1, 3, 5 et 7 setis nigris erectis seriatim et remote ornatis. Epipleurae uniformiter sulphureae. Subtus brunnea, abdomine obscuriore. Pedes longissimi, sulphurei; femorum dimidia parte apicali brunnea et setis nigris raris ornata. Antennae pubescentes, articulis omnibus (duobus primis exceptis nigro pilosis) apice longissime flavo-pilosis.*

Tête brune avec, çà et là, des reflets métalliques, rugueuse, garnie d'une pubescence pâle, courte et espacée; front carré en avant des yeux, occiput régulièrement arrondi; soies noires dressées sur la tête au nombre de 8 : une à chaque angle antérieur de l'épistome, deux le long de chaque œil et deux occipitales au bord postérieur. Les antennes ont la forme très caractéristique du genre : l'article 1 plus long que les deux suivants réunis, 2 très court, 3, 4 et 5 de même longueur et légèrement noueux à leur extrémité apicale, les suivants allant en augmentant un peu de longueur; les antennes sont testacées (sauf les 3 derniers articles rembrunis), pubescentes, avec l'apex de chaque article garni (surtout en dessous) de très longues soies pâles, plus longues que les articles eux-mêmes; sur les 2 premiers articles ces soies sont noires. Pronotum subcylindrique, de même couleur que la tête, rugueusement strié transversalement avec un

sillon médian nettement indiqué entre le milieu et le col qui est court et un peu évasé; les côtés sont munis d'une sorte de côte longitudinale en dehors de laquelle ils sont comme épaissis et plus obscurs que le dessus. Élytres jaune pâle, munis chacun de 9 stries bien marquées et colorées en brun, surtout à l'arrière; intervalles assez plats, très finement granuleux, avec un léger reflet métallique, visible surtout dans les parties sombres, présentant au milieu de chacun des intervalles impairs (1, 3, 5 et 7) une rangée longitudinale unique de grosses soies noires très espacées (semblant très caduques) et ornés de fascies et de taches brunes : 1° une fascie humérale assez pâle partant de l'épaule et descendant obliquement vers la suture; 2° une fascie médiane beaucoup plus foncée, plus large sur les côtés, très étroite sur le 4e intervalle; 3° d'une tache subapicale sur chacun des intervalles 1, 2 et 3. Le rebord de l'élytre contourne l'épaule et se prolonge sur la base jusqu'à la naissance de la 5e strie; la fascie humérale ne s'étend pas sur ce rebord qui reste jaune soufre. Les strioles scutellaires, très nettes, sont parallèles. L'écusson, très petit, est en triangle allongé. Tout le dessous est brun, l'abdomen étant plus foncé que le reste. Pattes jaune pâle, très longues et grêles; les cuisses seules sont brunes dans au moins leur moitié apicale, les antérieures sont assez renflées et toutes sont garnies, dans leur partie sombre, de quelques grosses soies noires spiniformes.

Fig. 1. — *Smeringocera Gestroi*, n. sp., × 12.

Habitat : Somalie italienne, cours moyen du fleuve Juba.

L'unique exemplaire, que j'ai dessiné et décrit, appartient au Musée civique de Gênes et m'a été communiqué par le Dr R. Gestro, auquel je suis heureux de dédier cette espèce remarquable. L'étiquette porte : « F. Ganana, 14-16 III, 1893, Ruspoli ». Ganana est une des nombreuses dénominations du fleuve Juba. D'après l'itinéraire du

voyageur italien Eugenio Ruspoli, l'espèce a été prise au confluent du Web (ou Ueb) avec le Juba (ou Ganale, ou Ganana) par 4° 20′ de lat. N.

Le genre *Smeringocera* a été créé par Chaudoir (*Bull. Nat. Moscou* [1862], IV, p. 298) pour *Casnonia lineola* Dej. qui, jusqu'à présent, en était (avec *C. transversalis* Lap.-Cast., qui n'est qu'une variété de *lineola*) le seul représentant.

S. Gestroi doit incontestablement rentrer dans ce genre par la conformation de ses antennes et de son prothorax. Son système de coloration, absolument spécial dans ce groupe et très remarquable, ne permet aucune confusion avec *S. lineola* Dej. décrit du Sénégal et que j'ai reçu de Sedhiou sur la Casamance (E. Laglaize). *S. lineola* est plus petite, entièrement d'un bronzé obscur, avec une bande transversale subhumérale jaune, étroite et rectiligne et une linéole jaune longitudinale sur le 2e intervalle près de l'apex; enfin avec les strioles scutellaires fortement convergentes en arrière.

Colpodes usambaranus, n. sp. — *Long.* 14,5 mill. (*spinis excl.*). *Totus aeneo-cyaneus, nitidissimus, laevis; ore, antennis, femorum apice, tibiis tarsisque rufis. Pronotum subtransversale, lateribus sat regulariter rotundatis, explanatis et elatis, margine rufescente; angulis anticis prominulis, posticis late rotundatis. Elytra elongata, leviter sed distincte striata, striis vage punctatis, intervallis planis; apice singulatim longe spinosa, spinis rectis acutissimis. Pedes sat robusti, articulo 4° tarsorum bilobato.*

Entièrement bleu d'acier, très brillant et lisse; antennes et parties buccales, tarses, tibias et sommet des cuisses brun rouge. Pronotum un peu plus large que long avec les côtés régulièrement et largement arrondis, les bords latéraux aplatis, relevés et légèrement roussâtres, une strie médiane longitudinale très fine mais complète, d'un bout à l'autre; angles antérieurs légèrement proéminents, postérieurs largement arrondis. Élytres très allongés, assez parallèles, présentant des stries vaguement ponctuées, nettes quoique superficielles; intervalles plans et lisses. Chaque élytre armé d'une forte épine apicale droite, à pointe très aiguë et rougeâtre. Pattes assez robustes; 4e article de tous les tarses fortement bilobé.

Habitat : Usambara, province du nord-est de l'Afrique orientale allemande (P. Weise). Décrit sur 7 exemplaires dont 4 dans ma collection.

Cette espèce, d'une forme fréquente à Madagascar, mais tout à fait nouvelle pour l'Afrique, présente une ressemblance remarquable avec

C. Sicardi Alluaud (*Ann. Soc. ent. Fr.*, [1909], p. 60) du Nord de Madagascar. Elle s'en distingue par les antennes un peu moins longues et surtout plus fortes et plus rouges; par la tête plus large, le pronotum moins allongé avec les côtés plus régulièrement arrondis (subanguleux au tiers antérieur chez *C. Sicardi*), les angles antérieurs un peu proéminents (nullement chez *C. Sicardi*); par les stries des élytres moins profondes et leur surface plus brillante; enfin par les pattes moins grêles et la couleur rouge du sommet des fémurs et des tibias (ces derniers noirs chez *C. Sicardi*).

Bulletin bibliographique.

Hawaiian Entomological Society, Honolulu, I, 1905-1907. — Perkins (R.-C.-L.) : Acarid chamber in body of wasp; p. 29. — Id. : Notes on a trip to Australia; p. 8. — Id. : Notes on Australian butterflies; p. 23. — Id. : Insects taken at Laysan; p. 33. — Id. : On a method of setting insects; p. 25. — Id. : The insects of Tantalus; p. 38. — Id. : A new method of relaxing and cleaning specimens; p. 52. — Id. : Notes on Hawaiian wasps with descriptions of new species; p. 61. — Id. : *Tomocera,* a genus of scale-bug parasites, with description of a new species; p. 75. — Id. : On a species of *Proterhinus* from Samoa; p. 87. — Id. : Insects at Kilanea; p. 89. — Id. : Notes on Hawaiian aculeate Hymenoptera; p. 111. — Id. : *Melittobia hawaiiensis* sp. nov. (Hym.); p. 124. — Id. : Supplementary notes on *Rhynchogonus Blackburni* and its parasites; p. 130, fig. — Id. : Immigration of Hemiptera into Oceanic islands; p. 172. — Id. : Bibliographical note on family Aleyrodidae; p. 186. — Id. : List of described Hemiptera of Hawaiian islands; p. 185. — Kirkaldy (G.-W.) : Stridulation in waterbugs; p. 15. — Id. : Literature of Hawaiian entomology for 1905; p. 35. — Id. : On some peregrine Aphidae in Oahu; p. 99. — Id. : On two Hawaiian Thysanoptera; p. 102. — Id. : On two Vitian Chermidae; p. 103. — Id. : The literature of 1906 dealing with Hawaiian entomology; p. 107. — Id. : A note on the introduction of *Culex fatigans* into the Hawaiian isles; p. 121. — Id. : Biologic notes on the Hemiptera of the Hawaiian isles N° 1; p. 135, fig. — Id. : Immigration of Hemiptera into Oceanic islands; p. 172. — Id. : Bibliographical note on family Aleyrodidae; p. 185. — Id. : List of Hemiptera of Hawaiian isles; p. 186. — Dine (D.-L. van) : Mouthparts of sawflies; p. 19, pl. I-II.

— Id. : Notes on *Cryptorrhynchus mangiferae* F.; p. 79. — Swezey (O.-H.) : Life-history notes and observations on three common moths; p. 53. — Id. : *Rhyparobia maderae* (Orth.); p. 37. — Id. : The sweet potato-vine borer (*Omphisa anastomosalis* Guen.); p. 76. — Id. : Experiments in breeding *Spodoptera mauritia*; p. 166. — Id. : Notes on *Chaetogaedia monticola;* p. 163. — Id. : Notes on orchid weevil; p. 163 — Id. : Notes on *Sphinx convolvuli;* p. 114. — Id. : Observations on recent swarms of caterpillars at Kaimuki; p. 118. — Id. : *Odynerus* parasites; p. 121. — Id. : A *Omiodes* egg-parasite (*Trichogramma pretiosa*) (Hym.); p. 125. — Id. : Observations on the life-history of *Oliarus koanoa* Kirkaldy (Hem.); p. 83. — Id. : An extraordinary leafhopper from Konahuani (Hem.); p. 104. — Id. : Life history and notes on *Atractomorpha crenaticeps* Blanch. (Orth.); p. 106. — Swezey (Mrs. O.-H.) : Observation on the life history of Psychodidae or moth-flies (Dipt.); p. 116. — Terry (F.-W.) : The increase of the antennal segments in certain Forficulidae; p. 58. — Id. : Notes on the life history of an endemic Hemerobiid (*Nesomicromus vagus*); p. 174. — Kotinski (J.) : Parasite of an Orthopterous egg; p. 59. — Id. : *Tribolium ferrugineum* F., an enemy of *Megachile palmarum* Perkins (Hym.); p. 85. — Id. : Notes on *Eucoila impatiens*; p. 171. — Id. : Coccidae from Singapore collected by F. Muir; p. 167. — Giffard (W.-M.) : Breeding experiments and some observations on the life history of *Rhyncogonus Blackburni*; p. 127, pl. iii. — Id. : Notes on Coccinellidae; p. 173. — Id. : Notes on *Heteramphus*; p. 173.

Wiener Entomologische Zeitung, XXXIII, 1914. — Enderlein (G.) : Dipterologische Studien; p. 151, fig. — Bergroth (E.) : Eine neue neotropische Cicade; p. 175, fig. — Id. : Zwei neue paläarktische Hemipteren, nebst synonymischen Mitteilungen; p. 177, fig. — Haij (B.) : Zwei sehr bemerkenswerte neue Varietäten von *Tetrix Kraussi* Saulcy; p. 184, fig. — Priesner (H.) : Beitrag zu einer Thysanopteren-Fauna Oberösterreichs und Steiermarks; p. 186. — Hartmann (F.) : Drei neue afrikanische Rüsselkäfer; p. 197. — Landrock (K.) : Eine neue Art der Pilzmückengattung *Mycetophila* Meig.; p. 201, fig. — Heller (K.-M.) : Eine dritte *Protopacessus*-Art; p. 203, fig. — Pic (M.) : Notizen und Berichtigungen über verschiedene Bruchidae; p. 205. — Fleischer (A.) : Neue Coleopteren-Aberrationen aus Kroatien u. Ungarn; p. 206. — Villeneuve (J.) : Notes synonymiques; p. 207. A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. Bedel.

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

RÉSULTATS SCIENTIFIQUES

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. ALLUAUD et R. JEANNEL, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. ALLUAUD et R. JEANNEL.

Crustacés : I, *Phyllopoda*, par E. DADAY DE DEÉS.
II, *Amphipoda*, par E. CHEVREUX.

Arachnides : I, *Opiliones*, par le Dr C.-Fr. ROEWER, avec une planche noire.
II, *Ixodidae*, par L.-G. NEUMANN.
III, *Araneae* (1re partie), par L. BERLAND.

Hémiptères : I, *Pentatomidae*, par le Dr R. JEANNEL, avec quatre planches noires.
II, *Naucoridae*, *Nerthridae*, *Belostomidae* et *Nepidae* par A.-L. MONTANDON.

Strepsiptères : par le Dr R. JEANNEL, avec une planche noire.

Coléoptères : I, *Pselaphidae*, par A. RAFFRAY.
II, *Scarabaeidae* (*Onthophagini*), par H. D'ORBIGNY.
III, *Meloidae*, par M. PIC, avec une planche coloriée.
IV, *Hylophilidae* et *Anthicidae*, par M. PIC, avec une planche noire.
V, *Scarabaeidae*, par E. BENDERITTER, avec une planche noire.

Hyménoptères : I, *Proctotrupidae*, *Cynipidae* et *Evaniidae*, par J.-J. KIEFFER.
II, *Formicidae*, par le Dr F. SANTSCHI, avec deux planches noires.
III, *Chrysididae* et *Vespidae*, par R. DU BUYSSON.
IV, *Braconidae*, par GY. SZÉPLIGETI.

Diptères : I, *Chironomidae* et *Cecidomyidae*, par J.-J. KIEFFER.
II, *Nematocera*, par F.-W. EDWARDS.

Myriapodes : I, *Chilopoda*, par H. RIBAUT, avec une planche noire et deux planches doubles.
II, *Symphyla*, par H. RIBAUT, avec une planche double.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. VIRIEUX, avec deux planches noires.

Turbellariés, Trématodes et Gordiacés, par P. DE BEAUCHAMP, avec une planche noire.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le Dr J. PELLEGRIN, avec une planche noire.

Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par F. Walker. London, 1869, in-8°. . . . . 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères d'Europe, in-8°, Moulins. (Extr. Rev. sc. Bourb.) :

I. *Nécrophages* (traduit de Reitter), 1890. . . 1 fr.

II. *Colydiides, Rhysodides, Trogositides* (traduit de Reitter), 1891. . . . . 0 fr. 50

Histérides nouveaux (*Description d'*), par S. de Marseul, in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.). . . . . 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de Bonvouloir, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 planches gravées. . . . . 5 et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Ragonot, in-8°, 276 p., 4 pl. color. (Extr. Ann. Fr. 1890). 10 et 12 fr.

Le même, pl. noires. . . . . 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae *et* Galleriidae par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Fr. 1888). . 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et description d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ragonot, in-8°, 66 p., 1 pl. color. (Extr. Ann. Fr. 1894). 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch. Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr. Ann. Fr. 1895). . . . . 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae, by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p . . . . . 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae, by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p. . . . . 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in-4°, 52 p. (Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. l. n. d. 5 et 6 fr.

Genera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray, in-8°, 621 p., 3 pl. (Extr. des *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1903). 20 et 25 fr.

Pour les *Membres* de la Société, les offres d'échanges, demandes de communications ou de renseignements d'ordre *purement scientifique*, qui n'excéderont pas *cinq* lignes, seront insérées *gratuitement* dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont pas *dix* lignes, elles coûteront 0 fr. 20 la ligne pour deux numéros.

La Société entomologique de France tient ses séances les 2e et 4e mercredis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, *rue Serpente*.

Elle publie :

1° **Les Annales de la Société entomologique de France** (4 fascicules par an avec planches et figures);

2° **Le Bulletin de la Société entomologique de France** (21 numéros par an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colonies françaises, paient une cotisation annuelle de. . . . . 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient. . . . . 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans) qui paient une cotisation annuelle de. . . . . 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé **Membre à vie.** Il n'a plus de cotisation à solder, reçoit *franco* les *Annales*, le *Bulletin*, et, *à titre de prime gratuite*, une série de dix volumes des *Annales* parmi ceux à *prix réduit* restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et consécutives d'au moins 100 francs.

Les Etablissements publics et les Sociétés scientifiques de la France et de l'Étranger peuvent se faire inscrire sur la liste des Membres de la Société.

La **Bibliothèque** (28, rue Serpente) est ouverte aux Societaires les *mardis*, *vendredis* et *samedis* de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2, le *mercredi, de* 8 *à* 11 *heures du soir*, et le *jeudi lendemain de séance*, de 3 *à* 6 *heures* 1/2.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. DE MARSEUL, continué par la **Société entomologique de France,** publie spécialement des travaux sur les COLÉOPTÈRES de l'Ancien Monde.

M. L. BEDEL, *20, rue de l'Odéon,* est chargé de la publication du Journal (*examen et admission des mémoires et correspondance scientifique*).

Le montant des abonnements **L'Abeille** à (10 fr. ou 12 fr. *par volume*) doit être adressé à M. J. MAGNIN, Bibliothécaire adjoint de la Société entomologique, *28, rue Serpente.*

COLLECTIONS

1° **Collection H. Sénac** (*Tenebrionidae paléarctiques*),
2° **Collection Ch. Brisout de Barneville** (*Coléoptères d'Europe paléarctiques*),

chez M. L. BEDEL, 20, rue de l'Odéon;

3° **Collection Peyerimhoff** (*Microlépidoptères*),
4° **Collection H. Brisout de Barneville** (*Coléoptères d'Europe*),
5° **Collection Aubé** (*Coléopteres d'Europe*),
6° **Collection complète des Orthoptères de France**, don **Finot**,
7° **Collection d'Hemiptères de France**, don **Fairmaire**,
8° **Collection Pandellé** (*Diptères de France*),
9° **Collection de Diptères de France**, don de M. le Dr **Gobert**,
10° **Collection entomologique française de tous les ordres**,
11° **Collection d'exemplaires** *typiques*,

au Siège social, 28, rue Serpente.

La « **Commission des Collections** » est chargée de créer ces deux dernières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a été louée et est prête à recevoir les Insectes français de tous ordres et les *Types* que les membres voudront bien envoyer, avec *localités précises.*

SOMMAIRE DU N° 18

Séance du 25 novembre 1914

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Distinction honorifique. — Nécrologie. — Changement d'adresse. 469

COMMUNICATIONS

E. SIMON. — Descriptions de plusieurs espèces d'Arachnides récemment découvertes en France. 469

M. PIC. — Sur divers *Chauliognathus* Hentz [COL.] 471

Ch. ALLUAUD. — Contributions à l'étude des Carabiques d'Afrique et de Madagascar [COL.]. — I. Descriptions de deux espèces nouvelles 472

Bulletin bibliographique. 473

Pour la *correspondance scientifique*, les *réclamations, annonces*, s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6e.

TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET Cie. — PARIS.